

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
 このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。  
 先生方には大変ご迷惑をおかけいたしました。何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬 白

### 記

■ 実施日 平成26年4月1日（火）ご依頼分より

■ 変更項目および変更内容

| 案内書掲載頁 | 項目コード No. | 検査項目                                  | 変更箇所 | 新              | 現                   |
|--------|-----------|---------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| 32     | 0963 8    | プレグネノロン                               | 基準値  | 詳細は次頁をご参照ください。 | 詳細は次頁をご参照ください。      |
| 33     | 0813 7    | エストロゲン総 非妊婦                           |      |                |                     |
|        | 4339 1    | エストロゲン3分画<br>(エストロン、エストラジオール、エストリオール) |      |                |                     |
|        | 5121 1    | エストロン (E <sub>1</sub> )               |      |                |                     |
|        | 5841 8    | エストラジオール (E <sub>2</sub> )            |      |                |                     |
|        | 5122 9    | エストリオール (E <sub>3</sub> )             |      |                |                     |
| 34     | 0822 5    | 5 $\alpha$ ジヒドロテストステロン                |      |                |                     |
| 118    | 0995 9    | トリメタジオン                               | 検査方法 | LC-MS/MS       | Gas-Chromatograph 法 |

下記検査項目におきまして、測定委託先より、システム改修に伴い、基準値が変更となる旨、連絡がございました。つきましては検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

| 案内書掲載頁 | 項目J-ド<br>No. | 検査項目                                      | 変更箇所 | 新   | 現   |
|--------|--------------|---|------|---|---|
| 32     | 0963 8       | プレグネノロン                                   | 基準値  | 男性：0.10～1.00<br>女性：0.20～1.50<br>(ng/mL)   | 男性：0.1～1.0<br>女性：0.2～1.5<br>(ng/mL)   |
| 33     | 0813 7       | エストロゲン総<br>非妊婦                            | 基準値  | 女性<br>卵胞期 3.00～20.0<br>排卵期 10.0～60.0<br>黄体期 8.00～50.0<br>閉経後 10.0 以下<br>男性 2.00～20.0<br>( $\mu$ g/day)  | 女性<br>卵胞期 3～20<br>排卵期 10～60<br>黄体期 8～50<br>閉経後 10 以下<br>男性 2～20<br>( $\mu$ g/day)   |
| 33     | 4339 1       | エストロゲン3分画<br>(エストロン、エストラ<br>ジオール、エストリオール) | 基準値  | 下記エストロン、エストラジオール、エストリオールの<br>基準値をご参照ください。   |   |
| 33     | 5121 1       | エストロン (E <sub>1</sub> )                   | 基準値  | 女性<br>卵胞期 1.00～8.00<br>排卵期 2.00～20.0<br>黄体期 5.00～20.0<br>男性 0.30～10.0<br>妊婦<br>21～24 週 410～2630<br>25～28 週 465～3140<br>29～32 週 379～3360<br>33～36 週 445～3960<br>37～40 週 465～5490<br>( $\mu$ g/day)                 | 女性<br>卵胞期(前期) 7.5～20.0<br>卵胞期(後期) 5.0～35.0<br>排卵期 16.0～55.0<br>黄体期 12.0～40.0<br>男性 15.0 以下<br>妊婦<br>21～24 週 410～2630<br>25～28 週 465～3140<br>29～32 週 379～3360<br>33～36 週 445～3960<br>37～40 週 465～5490<br>( $\mu$ g/day)            |
| 33     | 5841 8       | エストラジオール<br>(E <sub>2</sub> )             | 基準値  | 女性<br>卵胞期 0.50～5.00<br>排卵期 2.00～10.0<br>黄体期 5.00～20.0<br>男性 0.10～3.00<br>妊婦<br>21～24 週 369～1270<br>25～28 週 368～1500<br>29～32 週 582～1500<br>33～36 週 561～2530<br>37～40 週 683～3130<br>( $\mu$ g/day)                 | 女性<br>卵胞期(前期) 3.6～11.0<br>卵胞期(後期) 3.5～19.0<br>排卵期 11.0～29.0<br>黄体期 7.0～26.0<br>男性 0.2～2.1<br>妊婦<br>21～24 週 369～1270<br>25～28 週 368～1500<br>29～32 週 582～1500<br>33～36 週 561～2530<br>37～40 週 683～3130<br>( $\mu$ g/day)             |
| 33     | 5122 9       | エストリオール(E <sub>3</sub> )                  | 基準値  | 女性<br>卵胞期(前期) 1.00～8.00<br>排卵期 2.00～20.0<br>黄体期 5.00～30.0<br>男性 0.30～10.0<br>妊婦<br>21～24 週 6700～23700<br>25～28 週 8250～31500<br>29～32 週 9450～33400<br>33～36 週 11500～74200<br>37～40 週 17400～87300<br>( $\mu$ g/day) | 女性<br>卵胞期(前期) 3.0～25.0<br>卵胞期(後期) 3.7～41.0<br>排卵期 5.6～74.0<br>黄体期 7.8～57.0<br>男性 1.8～11.0<br>妊婦<br>21～24 週 6700～23700<br>25～28 週 8250～31500<br>29～32 週 9450～33400<br>33～36 週 11500～74200<br>37～40 週 17400～87300<br>( $\mu$ g/day) |
| 34     | 0822 5       | 5 $\alpha$ ジヒドロテストステ<br>ロン                | 基準値  | 男性：0.20～1.00<br>女性：0.05～0.30<br>(ng/mL)   | 男性：0.2～1.0<br>女性：0.05～0.3<br>(ng/mL)  |

### ▼変更後の検査内容一覧

| 項目コード<br>(統一コード)  | 検査項目  | 検体量<br>(mL) | 容器     | 保存<br>(安定性) | 所要<br>日数 | 実施料<br>判断料 | 検査方法         | 基準値<br>(単位)                                   | 備考   |
|-------------------|---|-------------|--------|-------------|----------|------------|--------------|---|--|
| 0963 8<br>(4D100) | プレグネノロン   | 血清<br>0.5   | ↓<br>X | 凍結          | 8~21     |            | RIA<br>硫酸塩析法 | 男性<br>0.10~1.00<br>女性<br>0.20~1.50<br>(ng/mL) | &C   |
| 0813 7<br>(4F010) | エストロゲン総<br>非妊婦                                    | 蓄尿<br>5     | Y      | 凍結          | 10~16    |            | RIA<br>硫酸塩析法 | 下記参照  | 冷暗所にて24<br>時間蓄尿し、よ<br>く混和し、必要<br>量をご提出くだ<br>さい。性別(性<br>周期)を明記し<br>てください。<br>&C |
| 4339 1            | エストロゲン<br>3分画<br>(エストロン、エスト<br>ラジオール、エストリ<br>オール) | 蓄尿<br>5     | Y      | 凍結          | 8~14     |            | RIA<br>硫酸塩析法 |   | 性別を明記して<br>ください。また<br>妊婦の場合は妊<br>娠週数を明記し<br>てください。<br>&C                       |
| 5121 1<br>(4F020) | エストロン(E <sub>1</sub> )                            | 蓄尿<br>5     | Y      | 凍結          | 8~14     |            | RIA<br>硫酸塩析法 |   |  |
| 5841 8<br>(4F025) | エストラジオール<br>(E <sub>2</sub> )                     | 蓄尿<br>3     | Y      | 凍結          | 8~14     |            | RIA<br>硫酸塩析法 |   |  |
| 5122 9<br>(4F030) | エストリオール<br>(E <sub>3</sub> )                      | 蓄尿<br>5     | Y      | 凍結          | 8~14     |            | RIA<br>硫酸塩析法 |   |  |
| 0822 5<br>(4F075) | 5αジヒドロ<br>テストステロン                                 | 血清<br>1.2   | ↓<br>X | 凍結          | 8~14     |            | RIA<br>硫酸塩析法 | 男性<br>0.20~1.00<br>女性<br>0.05~0.30<br>(ng/mL) | &C   |
| 0995 9<br>(3L205) | トリメタジオン   | 血清<br>0.5   | ↓<br>X | 凍結          | 7~13     | 特          | LC-MS/<br>MS | 300~500<br>(μg/mL)                            | ミノアレ<br>(活性代謝物である<br>ジメタジオンを測<br>定)<br>&M                                      |

特：特定薬剤治療管理料

[0813 7]エストロゲン総 非妊婦

|        |     |           |
|--------|-----|-----------|
| 女<br>性 | 卵胞期 | 3.00~20.0 |
|        | 排卵期 | 10.0~60.0 |
|        | 黄体期 | 8.00~50.0 |
|        | 閉経後 | 10.0以下    |
| 男<br>性 |     | 2.00~20.0 |

(μg/day)

[4339 1]3分画 [5121 1] E<sub>1</sub> [5841 8] E<sub>2</sub> [5122 9] E<sub>3</sub>(μg/day)

|             |        | エストロン     | エストラジオール  | エストリオール     |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 非<br>妊<br>婦 | 女<br>性 |           |           |             |
|             | 卵胞期    | 1.00~8.00 | 0.50~5.00 | 1.00~8.00   |
|             | 排卵期    | 2.00~20.0 | 2.00~10.0 | 2.00~20.0   |
|             | 黄体期    | 5.00~20.0 | 5.00~20.0 | 5.00~30.0   |
|             | 男<br>性 | 0.30~10.0 | 0.10~3.00 | 0.30~10.0   |
| 妊<br>婦      | 21~24週 | 410~2630  | 369~1270  | 6700~23700  |
|             | 25~28週 | 465~3140  | 368~1500  | 8250~31500  |
|             | 29~32週 | 379~3360  | 582~1500  | 9450~33400  |
|             | 33~36週 | 445~3960  | 561~2530  | 11500~74200 |
|             | 37~40週 | 465~5490  | 683~3130  | 17400~87300 |